

Kelly(神经母细胞瘤)

产品描述

种属：人源 (Homo Sapiens)
组织来源：脑 (Brain)
疾病：神经母细胞瘤 (Neuroblastoma)
年龄：1岁 (1year)
性别：女性 (Female)
细胞类型：表皮细胞 (Epithelial)
生长特性：贴壁生长 (Adherent)

拆包 & 存储

1. 请立即检查包装是否有破损或漏液。
2. 请立即将细胞培养瓶从包装盒中取出，并按照下方操作步骤进行培养或传代。

注意：如为冻存管，请收到后立即解冻进行培养。

培养瓶中细胞操作步骤

对于贴壁培养的细胞，寄送前，我们会将培养基充满整个培养瓶，以减少产品运输过程中贴壁细胞的脱落。

1. 收到细胞产品后，请注意观察是否有污染。将培养瓶置于倒置显微镜下仔细检查是否浑浊、是否细菌污染。因在运输过程中存在颠簸，且有些细胞对温度变化也很敏感，可能存在一些细胞脱落漂浮的情况，这些细胞仍是活细胞，请勿丢弃，可离心富集后传代使用。

2. 对于贴壁培养的细胞，在生物安全柜环境中，用真空泵去除培养瓶中的多余培养基，至剩余 5-8 mL 左右，随后将细胞置于

含有 5%CO₂ 的 37°C 恒温 培养箱中培养。如果细胞已经长满培养瓶，请立即传代。

3. 对于悬浮培养的细胞，在生物安全柜环境中，转移培养瓶中的细胞至离心管中，离心 200×g / 5-10 min，去除上清后，用 5mL 培养基吹散细胞，转移至新的培养瓶中，随后置于含有 5%CO₂ 的 37°C 恒温培养箱中培养。

冻存细胞操作步骤

注意：为保证细胞的高存活率，请收到产品后，立即解冻培养。

网址：www.hfwanwu.com

电话：400-1016-218

地址：合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层



1. 将冻存管置于 37℃ 水浴中来回晃动，迅速解冻。为避免污染，确保冻存管口置于水面之上。解冻需迅速，大约 2 分钟。
2. 一旦冻存管中液体融化后，立即取出，采用 70% 酒精喷拭冻存管表面。从此步开始，后续操作须在生物安全柜中完成。
3. 将冻存管中的液体转移到含有 5 mL 完全培养基的离心管中，离心 $200 \times g / 5 - 10$ min，用真空泵去除含有冻存液的上清。
4. 用完全培养基重新悬浮细胞并转移到新的培养瓶中。为保证细胞复苏的存活率，请将培养基在 37℃ 水浴预热后使用。
5. 将细胞置于含有 5% CO₂ 的 37℃ 恒温培养箱中培养。

贴壁细胞传代培养

1. 吸取并弃掉培养瓶中培养基。
2. 加入 1 mL 0.25% (w/v) Trypsin - 0.53 mM EDTA 溶液，并置于 37 °C 培养箱中孵育，直至细胞从壁上脱落分离。此过程大约需要 3 至 5 分钟（此处为 12.5 cm² 培养瓶所用体积，可根据实际情况增减用量）。
3. 加入 2mL 完全培养基中和胰蛋白酶，并轻轻吹打将细胞从培养瓶表面吹落，并使细胞分散。
4. 离心 $200 \times g / 5\text{min}$ ，去除上清后，取适量的培养基将细胞重悬，取适量悬液置于新的培养瓶中，并加入新鲜细胞完全培养基至总体积为 4 mL。
5. 将细胞置于含有 5% CO₂ 的 37°C 恒温培养箱中培养。

传代比例：建议 1:3 至 1:8

培养基换液：每周 1 至 2 次。

完全培养基配制

该细胞系培养所用基础培养基为 RPMI 1640，配置完全培养基时需加入 10% FBS.

使用范围

本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

