

牛原代结肠黏膜上皮细胞

产品规格： $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格：T-25 培养瓶

细胞详述：

结肠在右髂窝内续于盲肠，在第3骶椎平面连接直肠。结肠分升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠4部，大部分固定于腹后壁，结肠的排列酷似英文字母“M”，将小肠包围在内。

结肠横切面由内到外依次为：粘膜（上皮层，固有层，粘膜肌层），粘膜下层，肌层，外膜。其中上皮细胞主要位于粘膜层的上皮层，为单层柱状上皮，含较多的杯状细胞。结肠粘膜内有杯状细胞，可分泌碱性液体，保护结肠粘膜，润滑大便，以帮助排便。

细胞特性：

- 1) 细胞来源于动物的正常结直肠组织。
- 2) 细胞鉴定：细胞角蛋白-18（CK-18）免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式：上皮样，多角形细胞，贴壁培养。

产品的运输和保存：

视天气状况和运输距离远近，公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

- 1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8mL 的冻存管中，置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输；收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养，如无法立刻进行复苏操作，冻存细胞可在 -80°C 的条件下保存1个月。
- 2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输；收到细胞后请镜下观察细胞生长状态，如铺瓶率超过85%请立即进行传代操作，如悬浮的细胞较多，请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

推荐培养基：

我们推荐使用**原代上皮细胞培养体系**作为体外培养原代结肠黏膜上皮细胞的培养基。

产品使用：

- 1) 本产品仅能用于科研
- 2) 本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3) 本产品未通过用于活体诊断的审核

网址：www.hfwanwu.com

电话：400-1016-218

地址：合肥市蜀山区长江西路248号11层

