

兔原代杏仁核神经元细胞

Rabbit primary amygdala neuron cells

产品规格: $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

细胞详述

在严重创伤应激急性期, 边缘系统为应激应答敏感区, 其功能和应激联系密切, 杏仁核是边缘系统中重要的皮质下核团, 在创伤后应激障碍发病中起重要作用。

海马萎缩是由于海马神经元凋亡, 致体积减小, 杏仁核和海马的功能密切相关, 海马的部分功能可由杏仁核的调节而实现。神经元是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元具有长突起, 由细胞体和细胞突起构成。

细胞特性

- 1) 组织来源于实验动物的正常脑组织。本细胞为终末分化细胞, 增殖能力很弱, 建议客户收到细胞后直接用于后续实验, 不要进行扩增培养。
- 2) 细胞鉴定: β -tubulin 免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式: 不规则细胞, 贴壁培养。

推荐培养基:

我们推荐使用 **原代神经元细胞培养体系** 作为体外培养的培养基。

产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近, 公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8mL 的冻存管中, 置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输; 收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养, 如无法立刻进行复苏操作, 冻存细胞可在-80°C的条件下保存 1 个月。

2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输; 收到细胞后请镜下观察细胞生长状态, 如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作, 如悬浮的细胞较多, 请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

产品使用

- 1) 本产品仅能用于科研
- 2) 本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3) 本产品未通过用于活体诊断的审核

网址: www.hfwanwu.com

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层

