

MPC-11 小鼠浆细胞瘤细胞
Mouse plasmacytoma cells; MPC-11

产品描述

种属：小鼠 (*Mus musculus*)
品系：BALB/c
组织来源：血 (Blood)
疾病：浆细胞瘤 (Plasmacytoma)
年龄：未知 (Unknown)
性别：雌性 (Female)
细胞形态：淋巴母细胞 (Lymphoblast)
生长特性：悬浮生长 (Suspension)

拆包 & 存储

1、请立即检查包装袋是否有破损或漏液

2、请立即将细胞培养瓶从包装盒中取出，并按照下方操作步骤进行培养传代

注意：如为冻存管，请收到后立即解冻培养。若来不及解冻，请储存于液氮中。（存储于负 80 度，会降低细胞存活率）

培养瓶中细胞操作步骤

对于悬浮培养的细胞，寄送前，我们会将培养基充满整个培养瓶，以减少产品运输过程中细胞所受震荡。

- 1、收到细胞产品后，请注意观察是否有污染。将培养瓶置于倒置显微镜下仔细检查是否浑浊、是否细菌污染。
- 2、将培养瓶竖直放置于 37℃ 培养箱中直至温度平衡，随后，在生物安全柜中，转移培养瓶中的细胞至离心管中，离心 $200 \times g$ / 5 - 10 min，去除上清后，用 5mL 培养基吹散细胞。
- 3、对上述细胞悬液进行细胞计数及活力检测，调整细胞密度至 $2-3 \times 10^5$ cells/mL，并转移至新的培养瓶中。
- 4、将培养瓶竖直放置于含有 5%CO₂ 的 37℃ 恒温培养箱中培养。如果细胞达到传代培养的密度，则进行传代培养。

冻存细胞操作步骤

注意：为保存细胞的高存活率，请收到产品后，立即解冻培养。

- 1、将冻存管置于 37℃ 水浴中来回晃动，迅速解冻。为避免污染，确保冻存管口置于水面之上。解冻需迅速，大约 2 分钟。
- 2、一旦冻存管中液体融化后，立即取出，采用 70%酒精喷拭冻存管表面。从此步开始，后续操作须在生物安全柜中完成。
- 3、将冻存管中的液体转移到含有 5mL 完全培养基的离心管中，离心 $200 \times g$ / 5 - 10 min，用真空泵去除含有冻存液的上清。
- 4、用完全培养基重新悬浮细胞并转移到新的培养瓶中。为保证细胞复苏的存活率，请将培养基在 37℃ 水浴预热后使用。
- 5、将细胞置于含有 5%CO₂ 的 37℃ 恒温培养箱中培养。

网址：www.hfwanwu.com

电话：400-1016-218

地址：合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层



悬浮细胞传代培养

悬浮细胞的传代可通过补加或置换新鲜培养基的方式来完成，具体做法如下：

- 1、取出少量细胞悬液进行细胞计数及活力检测，当细胞密度达到 1.0×10^6 cells/mL 时，进行细胞传代培养。
- 2、取足量细胞加入到盛有新鲜培养基的培养瓶中，将细胞密度维持在 5×10^5 cells/mL。
- 3、将培养瓶竖直放置于含有 5%CO₂ 的 37℃ 恒温培养箱中培养。如果细胞达到传代培养的密度，则进行传代培养。

培养基换液：每隔 2 至 3 天。

注意：培养瓶应使用带滤膜瓶盖，以保持培养基中的空气和 CO₂

完全培养基配制

该细胞系培养所用基本培养基 Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM)，配置完全培养基时需加入 10% Horse serum, 1% Anti-Anti。

注意事项：

- 1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
- 2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意：冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。

使用范围

本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

