

大鼠原代肠肌成纤维细胞

Primary rat intestinal myofibroblasts

产品规格: $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

细胞详述

肠肌成纤维细胞主要包括 Cajal 间质细胞和肠上皮肌成纤维细胞。

肠纤维化的主要效应细胞是肠肌成纤维细胞。在炎症初期，大量肠成纤维细胞的出现是损伤愈合的征象，其活化转变为肌成纤维细胞导致自身过度增殖，分泌大量以胶原为主的 ECM 和细胞因子。

炎症和损伤时，多种细胞可向肠肌成纤维细胞转化，其中，静息的成纤维细胞或星状细胞的活化、血管周平滑肌细胞转化、上皮细胞向间质细胞转化、内皮细胞向间质细胞转化及骨髓来源的干细胞转化等。

细胞特性

- 1) 组织来源于肠纤维化实验动物的肠组织（**该细胞来源于造模动物**）。
- 2) 细胞鉴定： α -SMA 免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式：梭形细胞，不规则细胞，贴壁培养。

推荐培养基

我们推荐使用 **Delf 原代成纤维细胞培养体系** 作为体外培养大鼠原代肠肌成纤维细胞的培养基。

产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近，公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

- 1) 1ml 冻存细胞悬液装于 1.8ml 的冻存管中，置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输；收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养，如无法立刻进行复苏操作，冻存细胞可在 -80°C 的条件下保存 1 个月。
- 2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输；收到细胞后请镜下观察细胞生长状态，如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作，如悬浮的细胞较多，请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

注意事项:

- 1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
- 2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意：冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。

使用范围

本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

网址: www.hfwanwu.com

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层

