

人原代脐动脉内皮细胞

Human primary umbilical artery endothelial cells

产品规格: $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

细胞详述

脐带是哺乳类的连接胎儿和胎盘的管状结构。脐带中通过尿膜的血管即脐动脉和脐静脉, 卵黄囊的血管即脐肠系膜动脉及脐肠系膜静脉。在子宫中, 子宫动脉在胎盘的母体部分出的毛细血管, 与胎盘的子体部胎儿毛细血管靠近, 在此处母体和胎儿的血液间进行 CO_2 和 O_2 , 代谢产物即代谢废物和营养物质的交换。脐动脉将胎儿来的废物运送至胎盘, 脐静脉将 O_2 和营养物质从胎盘运送给胎儿。

脐带是分娩过程中的废弃物, 虽然从脐带中分离人脐动脉内皮细胞方法相对 HUVEC 更困难一些, 但脐动脉种流的是静脉血, 使脐动脉内皮细胞作为研究静脉内皮的工具细胞, 在医学和生物学研究领域中也有广泛应用。

细胞特性

- 1) 细胞来源于人脐带组织。
- 2) 细胞鉴定: 血小板-内皮细胞粘附分子 (PECAM-1/CD31) 或血管假性血友病因子 (vWF) 免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式: 上皮样细胞, 贴壁培养。

推荐培养基:

我们推荐使用 **Delf 原代内皮细胞培养体系** 作为体外培养的培养基。

产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近, 公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

- 1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8ml 的冻存管中, 置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输; 收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养, 如无法立刻进行复苏操作, 冻存细胞可在 $-80^{\circ}C$ 的条件下保存 1 个月。
- 2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输; 收到细胞后请镜下观察细胞生长状态, 如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作, 如悬浮的细胞较多, 请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

产品使用

- 1) 本产品仅能用于科研
- 2) 本产品未通过直接用于活体动物和人的审核
- 3) 本产品未通过用于活体诊断的审核

网址: www.hfwanwu.com

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层

