

小鼠原代肝实质细胞
Mouse liver parenchyma cell

产品规格: $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

细胞详述

随着人们生活水平的提高, 饮食习惯的改变, 肿瘤发病率也在不断的增加, 如肝癌、胃癌和大肠癌等明显增加的趋势。

肝脏作为人体重要的器官, 在整个物质代谢过程中具有广泛而多样的功能。肝脏也是体内药物代谢的重要器官, 体内复杂的环境对药物代谢等的影响是不言而喻的。

但是在体研究药物或其它化学物质在肝细胞代谢的分子机制有一定的困难, 因此我们建立体外的原代肝细胞培养模型用于肝细胞分子生物学特征的研究, 作为对在体肝脏研究模型的有益补充。

采用改良的灌流方法将肝脏中的肝实质细胞分离、纯化、体外培养, 全面分析原代肝细胞的生长和功能状态, 为肝细胞分子生物学特征的研究以及新药对肝脏的作用机制的研究提供更有价值的线索, 以更好的解释药物作用的机制。

细胞特性

- 1) 组织来源于实验动物的正常肝组织。
- 2) 细胞鉴定: 葡萄糖-6-磷酸酶 (glucose-6-phosphatase) 化学染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式: 上皮样, 多角形细胞, 贴壁培养。

培养基

我们推荐使用 **DELFL 原代肝实质细胞培养体系** 作为该细胞的培养基。

产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近, 公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8mL 的冻存管中, 置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输; 收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养, 如无法立刻进行复苏操作, 冻存细胞可在 -80°C 的条件下保存 1 个月。

2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输; 收到细胞后请镜下观察细胞生长状态, 如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作, 如悬浮的细胞较多, 请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

注意事项:

网址: www.hfwanwu.com

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层



- 1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
- 2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意：冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。

使用范围

本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

