

## 鸭胚肝间质细胞永生化

## Immortalization of Duck Embryo Liver Interstitial Cells

产品规格:  $>1 \times 10^6$  细胞数

包装规格: 1ml 冻存细胞悬液或 T-25 培养瓶

## 细胞详述

胎肝是胚胎发育中晚期的主要造血器官, 具有特殊的生物学活性。研究表明胎肝间质细胞与骨髓间质细胞一样具有多向分化能力, 而且能改善小鼠肾衰模型和糖尿病模型的症状。

**该细胞通过慢病毒转染的方式携带 SV40 基因。**

## 细胞特性

- 1) 细胞来源于实验动物正常胚胎肝组织。
- 2) 细胞鉴定: CD44 免疫荧光染色为阳性。
- 3) 经鉴定细胞纯度高于 90%。
- 4) 不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
- 5) 细胞生长方式: 长梭状细胞, 贴壁培养。

## 推荐培养基

我们推荐使用 DELF 原代间质细胞培养体系作为体外培养的培养基。

| 名称                | 体积    | 浓度      | 保存条件    |
|-------------------|-------|---------|---------|
| 原代间质细胞基础培养基       | 500ml | 1×      | 4℃、避光   |
| 原代间质细胞培养添加剂       | 5ml   | 100×    | -20℃、避光 |
| 胎牛血清 (FBS)        | 50ml  | 终浓度 10% | -20℃、避光 |
| 双抗 (青霉素/链霉素, P/S) | 5ml   | 100×    | -20℃、避光 |

## 产品的运输和保存

视天气状况和运输距离远近, 公司与客户协商后选择下述方式中的一种进行。

- 1) 1mL 冻存细胞悬液装于 1.8ml 的冻存管中, 置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输; 收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养, 如无法立刻进行复苏操作, 冻存细胞可在 -80℃ 的条件下保存 1 个月。
- 2) T-25 培养瓶充满完全培养基后进行常温运输; 收到细胞后请镜下观察细胞生长状态, 如铺瓶率超过 85% 请立即进行传代操作, 如悬浮的细胞较多, 请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。

## 注意事项:

- 1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性, 必须在二级生物安全台内操作, 并注意防护, 所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。
- 2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意: 冻存管浸没在液

网址: [www.hfwanwu.com](http://www.hfwanwu.com)

电话: 400-1016-218

地址: 合肥市蜀山区长江西路 248 号 11 层



氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。

#### 使用范围

本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。

